

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-5-73 530249

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. (56) 86-22-75)

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

ABONNEMENT ANNUEL

30,00 Francs

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 152 de Mai 1973

1973-18

LES TRAITEMENTS DU VIGNOBLE

La situation sanitaire du vignoble se présente actuellement comme suit :

- MILDIU :

Peu d'évolution depuis notre dernier bulletin. Aucune tache primaire n'est encore signalée en Gironde, Dordogne, Landes et Lot et Garonne. Seules quelques très rares taches ont été découvertes sur Tannat dans le vignoble de Bellocq, dans les Pyrénées Atlantiques.

- BLACK-ROT :

Apparition des premières taches, assez abondantes, sur feuilles dans quelques vignes abandonnées en Dordogne et en Gironde.

- OIDIUM :

Quelques rares symptômes sur feuilles sont observés depuis une semaine dans les parcelles fortement infestées l'année dernière.

- EUDEMIS ET COCHYLIS :

Le premier vol de papillons est en cours depuis le 10 mai, mais les pontes sont encore rares et aucune éclosion n'est observée.

Compte tenu de cette situation générale, nous conseillons d'adopter la conduite suivante :

1° - Dans les parcelles atteintes l'an dernier par le Black-Rot ou situées en bordure de vignes abandonnées malades, appliquer avant la fin de la semaine une pulvérisation fongicide mixte destinée à combattre le Black-Rot, le Mildiou et l'Oïdium.

2° - Dans les parcelles très infestées par l'Oïdium l'an dernier ou présentant actuellement les premiers symptômes de la maladie, appliquer au début de la semaine prochaine un traitement fongicide mixte destiné à combattre l'Oïdium et le Mildiou.

3° - Dans les autres cas, ne traiter qu'en cas de découverte de taches primaires de Mildiou (région de Bellocq). En leur absence, attendre un nouvel avis.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Des sorties de taches correspondant aux contaminations de la fin avril et des premiers jours de mai sont observées sur pommiers mal protégés. De nouvelles apparitions de taches, plus nombreuses, sont à redouter à partir de la fin de la semaine, conséquence des importantes contaminations qui ont pu se produire les 7 et 8 mai.

Appliquer immédiatement un nouveau traitement,

.../...

.../...

OIDIUM DU POMMIER

On assiste depuis quelques jours à une extension de l'Oïdium sur golden. Ajouter à la bouillie destinée à lutter contre la Tavelure, un fongicide efficace contre l'Oïdium (voir liste) en évitant si possible le Binapacryl (Ambox, Biarix) et le Chinomethionate (Morestan), en raison de leur action néfaste sur la faune utile actuellement abondante.

TAVELURE DU PECHER

La Tavelure du pêcher déprécie chaque année une proportion non négligeable de fruits dans certains vergers situés dans les situations humides, en particulier dans les vallées du Lot, de la Garonne et de la Baïse. Toutes les variétés ne présentent pas la même sensibilité; mais la plupart des variétés courantes sont atteintes, avec une intensité particulière pour Morettini

Pour limiter l'importance de la maladie, nous conseillons d'appliquer au cours des prochains jours une pulvérisation avec l'un des trois produits ci-dessous :

- Bénonyl (Benlate)
- Captane
- Soufre

Genon, le 23 mai 1973

L'Ingénieur d'Agronomie
et
L'Ingénieur des Travaux Agricoles
chargés des Avertissements Agricoles
J. TOUZEAU C. VENEQUE

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
Aquitaine
M. LARGE